

нарастания в фазу деполяризации. Увеличение длительности потенциала действия на различных уровнях реполяризации был наиболее ярко выражен в концентрациях 10^{-7} – 10^{-5} М. Максимальная скорость нарастания максимально увеличивалась при введении агониста в концентрации 10^{-5} М.

Таким образом, агонист во всех описанных концентрациях увеличивал изучаемые параметры потенциала действия. Полученные данные говорят о том, что увеличение данных параметров потенциала действия связано с непосредственным влиянием агониста на адренорецепторы кардиомиоцитов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-04-00071.

ОПРОСНИК «PELVIC PAIN QUESTIONNAIRE FOR GIRLS AND WOMEN»

Федоренко Алла Игоревна¹, Есин Радий Германович^{1,2}

¹Казанская государственная медицинская академия - филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования», Казань, Россия, allafed2803@mail.ru

²«Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия.

Неспецифическая тазовая боль у женщин является актуальной клинической проблемой. Одной из основных причин неудовлетворительной диагностики страдания в Российской Федерации является отсутствие стандартизованного подхода к оценке симптомов. Для решения этой проблемы в зарубежных странах разрабатываются специальные опросники.

Мы выбрали опросник тазовой боли для девушек и женщин, разработанный Фондом тазовой боли Австралии, который был переведен на русский язык в НИЛ КФУ «Клиническая лингвистика» с разрешения автора (Dr Susan Evans). Опросник состоит из 33 блоков, позволяющих систематизировать жалобы пациентки, ее медицинскую историю, историю семьи, количественно оценить степень выраженности болевого синдрома, уточнить его локализацию, и лекарственные препараты.

Для оценки эффективности опросника, нами был проведен опрос 50 женщин в возрасте 18-50 лет, страдающих тазовыми болями. Пациентки заполняли данный опросник дома, как рекомендует автор. Он выдавался им за несколько дней до приёма, а результаты оценивались врачом непосредственно во время приёма пациентки.

Применение данного опросника в практической работе показало, что он существенно упрощает работу врача, в условиях дефицита времени на амбулаторном приёме, и позволяет уделить больше времени работе с пациентом, что повышает уровень диагностики.